



DEO OPTIMO MAX.

UNI ET TRINO,

VIRGINI DEI-PARÆ, ET S. LUCÆ
Orthodoxorum Medicorum Patrono.

QUÆSTIO MEDICA,

QUOD LIBETARIIS DISPUTATIONIBUS,
manè discutienda, in Scholis Medicorum, die Jovis secundo mensis
Januarii, anno Domini M. DCC. XLIX.

M. PETRO BERCHER, Scholarum Professore,
Doctore Medico, Præside.

An ab uteri, ejusque vasorum perpendiculari situ, menstrua Mulierum Purgatio?

I.



ARIAS corporis humani partium, formas, situs, texturas contemplare, earum pro variis suis muneribus, pro variâ indole, artificiosissimam fabricam, singularem figuram, connexionem, actionem, & usus, mirari nunquam defines; adeò variè, adeò appositè, adeò utiliter ad flammam vitalem, intrâ machinæ nostræ claustra retinendam, construuntur omnes. Sed in utero præsertim stupendum certè multiplex artificium deprehendes; hunc enim operi cui destinatus erat, tanto apparatu, accingi oportuit. Porro præter primariam illam, & quasi triplicem quæ ipsi incum-

A

bit provinciam, fœtum concipiendi, concludendi, fovendi, altera etiam, quam secundariam rectè dicere possis, obigit, statim nimirum temporibus certam cruoris copiam foras ejiciendi: quam autem periodicam, menstruam ut plurimum evacuationem, tanquam sanitatis tutamen acceperunt mulieres, hæc siquidem superflui potius quàm immutati humores eliminantur; hinc purgatio nuncupatur, cui varia nomina & apud Vulgus & apud Magnates concessa fuere, quæ, vel ut omnibus nota, vel ut parvi momenti de industriâ omitimus; diversis adhuc nominibus ab Autoribus Latinis & Græcis promiscuè insignitur fluxus ille; quocumque nomine eum designare velis, hujus laticis scaruriginem in utero quæras. Is quasi victima singulo mense mactatur, hinc, scilicet ex utero, superfluous, sincerusque periodicè amandatur cruor, mactatæ recenter victimæ sanguini, aut ei qui pertusâ cubiti venâ exit, planè simillimus, nisi fortè aut diuturniori morâ, aut deterioris succi miscelâ vitium contraxerit, undè apparet, cur apud Plinium, & veteres plerosque criminum arcescatur menstruus sanguis, cur eis si fides sit, veneni dotes quandoque æmulatus fuerit, cur eum excrementitium nonnulli putarunt. Cum Heurnio * tutius asseverari potest ex essentia perversum non esse sanguinem illum, neque conviciis afficiendum esse naturæ opus, quod mulieribus sanitatem, parentibus liberos pollicetur; prava enim qualitas, si quandoque apparuit, à perversâ totius sanguinæ molis constitutione, sive scorbutico, sive syphilitico vitio inquinatæ repetenda est: uno verbo, si quædam hujus cruoris malignitatem comprobant experimenta, iis si certa supponantur, alia possunt obijci, quibus huic malignitatem deesse evincitur; ex iis unum, quia ignotum est, colligo. Chirurgus Parisiensis **, cui fides tutò potest adhiberi, cum mulierem quædam tætidum odorem, quoties hæc colluvie maderet, ut quibusdam contingit, corpore & ore effundentem cognosceret, linteis statim è pudendis ablatis, & sanguine menstruo adhuc calido maderactis, lagenam vitream optimo vino repletam, per plures dies obvolvitur, nec ullo modo alteratum fuit vinum illud; si tamen malignitate quædam præditus fuisset cruor, in vino certè, quod ad experimentum adhibitum fuit, hæc apparere debuisset. Peculiarem hanc evacuationem præcedit, & proximam prænuntiat insignis quæ in muliebri sexu, circâ pubertatis annos contingere solet mutatio: tunc enim pubes erumpit, attollitur in geminum nec indecorum tumorem pectus, fororiant mammæ, sanguis vix suis receptaculis coercitus, quocumque diffunditur, insolito fulgore micant oculi, spargitur ore purpureo vividus lepor, puellam denique jugali jam thoro habili prodit irrepens furtim in vultu, in gestu, in incessu ipso, in toto denique corporis habitu venustas; verùm hæc subitanea quæ exterius corpori tunc accidit mutatio, eadem intus in utero fit. Uterus in hypogastrio vesicam inter & intestinum rectum ad divaricationem usque osium pubis protenditur. Inversi pyri figuram æmulatur, & à fundo latiori, in satis exiguum collum desinit. Deprehenditur esse firmissimæ, densissimæque texture, quam efficiunt arteriæ & venæ, in ramos numero promodum infinitos dispersitæ, nervi, & membranæ cujusdam tendinosæ filamenta; ex his, scilicet uterinis valis quasi ex totidem fonticulis emanat purpureus ille latex, ingens disputandi argumentum. Aliis citius, aliis tardius incipit illud effluvium, nec certiores in desinendo servat leges. De his nihil

* Joan. Heurn. tom. 3. de morb. mulier. cap. 1.

** Baccalaurei proponentis Pater.

audeas decernere. Illius copia, pro temperamento, ætate, victu, regione variatur. Ueberius illæ purgantur, quæ graciliores & sanguineæ, fulcæ, quæ regiones frigidissimas colunt. In biliosis paulò maturius erumpit, celeriusque periodos suas conficit; fœminis gulæ deditis, ad sextum sæpè diem extenditur, tenui verò victu, aut exercitio multo utentibus, citius absolvitur. In junioribus puellis, quoddam sanguis multus in corporis nutrimentum cedit, sæpè longius fit periodi intervallum; ad debitum ubi pervenerit incrementum mulier, frequentior redit periodus. Si senescat, ab exsiccato tunc corpore, diuturnior indè periodi mora; in ætate provectiori, cujus terminos frustra indigites, excretio illa prorsus cessat, atque evanescit: suas vulgò inchoant periodos catamenia, circà secundum septenarium, & circà sextum, septimumve definunt. Quædam tres, aliæ quatuor, aliæ sex, sæpius verò tres dies, hæc colluvie madent fœminæ; quibusdam circà vigesimum, aliis circà vigesimum-septimum, aliis bis, aliis semel, aliis denique sæpius in mense redit hæc evacuatio. Cujus quantitas in adultis sanis, & robustis, uncias viginti adæquat: hoc pro primâ vice, instante fluxu, innumera symptomatum genera irruunt, eodem cessante subsequuntur morbi, nec pauci, nec curatu faciles; his duobus in extremis cruciantur mulieres; in imminuentibus menstruis pati ediscunt, nec absque periculo, menstruari obliviscuntur, hinc adagium illud. Undè gaudent fœminæ, indè tristantur, undè tristantur, indè gaudent: experiuntur reverà puellæ, uterum tortoris nonnunquam agere vices, & hæc undè vitam sumunt, mortis nebulas, sæpius exhalari. In tenellis virginibus, quæ menstruum effluxum nondum perpessæ fuerint, hunc innumera præfagiunt indicia; nihil non afflictum, nihil non debile, nihil in corpore ferè sanum.

I I.

EX quo dogmatica incœpit vigere Medicina, mirum quantum ingenia Medicorum exercuerit, ne dicam torserit, indaganda hujus fluxus periodici, notatu sanè dignissima ratio. In hujus inquirendis phænomenis, quot & quàm celebres incasum sudarunt viri? Horum causæ latent adhuc, latebuntque diù; catameniorum alternantes reditus Lunæ tribuunt plures, undè vulgare illud, effatum.

Luna vetus veteres, juvenes nova Luna repurgat.

Menstruum sanguinem archæi, vel fermenti cujusdam auxilio separari asserunt nonnulli, alii (a) purgationem hanc arcano & admirabili quodam naturæ beneficio, aut divinâ providentiâ ad futuram generationem perfici credunt, dum scilicet post menstruorum effluvium expurgato fordibus utero, conceptio facilius evadit, puriorque ad ovum allabitur sanguis. Quidam hanc evacuationem in canibus, ut in mulieribus ad nutritionem fœtus, quando supprimitur, inservire antumant; fuerunt qui non multum ab similes iis, qui functiones qualitatibus occultis subjiciunt, & explicant, *menstruificam* adscribere facultatem, inter antiquos nonnulli per valorem extrema, cotyledones dictâ, & periodicè rupta, cruorem excidere asserunt. Multi, & recentiores ferè omnes, catameniorum eruptionis causam, sanguinis exuperantiæ referunt; eam sumit Bergerus, (b) à justâ, solidi liquidique, ex quibus coalluere mulierum corpora, porportione, cur autem per muliebria fluant, à singulari vasorum constructione repetit:

Hanc evacuationem idèd fieri vulgò dicitur, quoddam turgescant, & depleantur per vices uteri vasa, singulisque mensibus plethoram quamdam, alternis concipiant ac deponant; sicque pro generali istius fluxus causâ, sanguinis

(a) Ballonius

(b) Jof. Couthof. de Berg. Phys. Med. c. 20.

redundantiam afferunt. Verum quidem est plethoræ in mulieribus, & sanguinis in utero regurgitationi favere, humidus earum temperamentum, laxiora partium stamina, rariorem, mollioremque carnem, cutis minùs patentes poros, vitam desidem, liberaliorem cibi euchymi usum, vasa denique uterina præ cæteris omnibus dilatari ac distendi docilia, proindeque infarctui quàm maximè opportuna. Hæc ab iis quæ vulgò occurrunt experimentis astruit opinio, observatur enim, inter mulieres, eas quæ maximè sanguineæ sunt, mensibus maximè abundare, aulicæque pinguedine, & otio diffuentes largo huius evacuationis profluvio mancipari, dum rusticæ, parvo viventes, & duris exercitiæ laboribus, nullatenùs aut eam vix norunt purgationem, quia nempe his exercitiis, & vivendi ratione, fibræ indurantur, firmantur musculi, cutis elaterium augetur, & ex illius spiraculis, expulitur humor superfluus, alioquin in facili extensilem uteri substantiam decubiturus: at cur sanguis ille rarò per alia, plerumque per uterina erumpat vasa, quæris? Uterum & omnia generationis organa perscrutare, major est aortæ descendentis trunci diameter, innumeris arteriis, & venis, non carne musculosa, non adipe, ut in cæteris ferè quibuscumque corporis partibus intertextis, aut fufultis, nec ullâ distinctis valvulâ, sed inter se variè implicatis, & intortis constat uterus; curvis ductibus, uterum præreptant hæc vasa, & crescente utero faciliè extendi valent: qui igitur in vasis totius corporis redundat cruor, flexuosas uteri venas perlabitur, nimîa copiâ ipsas paulatim distendit, ac tandem magis ac magis intumescens, ultrâ metam distensas rumpit, sicque è venarum, & arteriarum osculis, stillans dimanat cruor. Nec satis est semel uterum hæc sarcinâ liberari, recurrit identidem statò tempore hæc vasorum ingurgitatio, quod in fœminis sanis, ad unius ferè mensis curriculum extendi animadvertitur, quòd cæteræ evacuationes, per unius mensis spatium, assumptorum quantitati non respondeant, corporis enim muliebris pondus, unâ ad alteram, menstruâ purgatione sensim crescit, artuum namque & totius corporis gravitas, quam instante periodicâ evacuatione percipiunt mulieres, virum restitutio, actionum alacritas, quas eadè cessante experiuntur, & varia quæ prætermittimus experimenta pondus hoc detegunt. Sic autem sanguinis, humorumque periodica sit redundantia, hoc quò turgebant, vasa, sanguine elapso, flaccida iterum evadunt, suprâ se invicem coincidunt, sponte suâ occluduntur eorum oscula, cessat uteri fluxus, donec altero mense redeat succorum coacervatio, quâ ab affluente solito copiosius sanguine, intumescens uterus gravetur, & factâ in dies novi humoris accessione, expedire se molesto pondere cogatur, tum viam sibi quærit impatiens sanguis, disrumpunt arteriolarum extrema, & quâ datâ portâ stillat.

III

I NTER eos, qui de Catamenis scripsere, aliùs disseruit Joh. Freind. (a) in utero nihil præter arteriarum & venarum ramos, ex utroque latere sibi invicem per anastomosim commissos, non recto cursu delatos, variè inter se implicatos, curvos, & serpentino cursu perreptantes inspexit, hæc uteri structurâ, & respectu horisontis perpendiculari situ innixus, vim quâ aperiantur vasa undè fluere debent Catamenia, æstimat & desumit, à sanguinis mole, & canalium perpendiculari situ; à pressione perpendiculari, ab ictû vi, & à resistentiâ, quam eò minorem supponit, quò vasa rectiora, majorem verò quò magis in vasorum curvaturas ad angulorum incidentiæ sinus accidit: fundamenta hypothesis Joh. Freindi diluta, & contrita fuere, à *Perono* quodam Medico, qui duo tantum, ad Catamenio-

(a) Emmen.

rum fluxum promovendum admittit. Amplitudinem scilicet Aortæ descendens, & arduum sanguinis ab utero regressum, qui pondere suo facile accedit, & inde ob valvularum in venis defectum, per flexuosa ductuum volumina, ad superas remeare partes, haud facile potest; causam hujus evacuationis ab arteriarum uteri parietum lymphaticarum plethorâ simplice distentarum petit. Celeberrimus in Acad. Monspel. Professor, (b) eodem circiter tempore, quo edita fuit Freindi emmenologia, de morbis mulierum agens, ab hujus opinione discedens, ideò periodicè fluere Catamenia contendebat, quia lactei tubuli lacte turgescunt, venasque circumrepentes ita comprimunt, ut collaterales seu conici ductus, qui venis citra compressionem appenduntur, irruentis sanguinis impetu, cogantur dehiscere in cavum uteri, sicque sanguinem guttatim effundant.

(b) M. Tizes.

IV.

CELEBERRIMI nostri Doctoris Angli, ingeniosum sanè est inventum, sed suis etiam scaturit difficultatibus.

1º Non à sanguinis mole repetenda est hæc evacuatio; alioquin post partum vasa rumpi & fluere deberent Catamenia, si quidem tunc augetur sanguinis moles; ictus vis in vasorum angulos, nec horum canalium innumerabiles gyri adhuc effluxum conferunt; nam in viris, aliisque animalibus, juxta eundem auctorem, non menstruatis hi reperiuntur vasorum inflexus.

Deinde verò, eò minori velocitate certè donatur sanguis, quò per numerosiora vasa fluendo, numerosiores resistencias superare cogitur; hoc cernere est in glandulis, in quibus, unanimi ferè Medicorum consensu, maxime retardatur sanguinis velocitas, à cuius imminutione & crudelissimæ illæ, quibus obnoxia sunt obstructions, & adeò variæ indolis succorum à fonte primario secretiones explicantur. Nedum igitur sanguinis velocitas, illis vasorum circvolutionibus augeatur, imò plurimum obtunditur, & ad minimum sensim reducitur sanguinis motus; quò enim pluribus obicibus occurrit, fluidum vel aliud quodcumque corpus motum, èd plus sui motus deperdet. Porro vasorum fluxus & gyri permeandi, totidem sunt obices, quibus potius rotandatur quàm acceleratur sanguinis motus; ergò vis ejus minor, hinc etiam omnes ferè uterini morbi ab obstructionibus oriuntur, quia pars illa, glandulæ simplicis instar, ex propagine vasorum omnis generis, in glomeres arctè secum invicem involutorum constatur. Nihil facit vasorum perpendicularis situs, undè ictus vim majorem concludit. Nam supponamus vas aliquod incurvatum cum decem angulis rectis & columnam fluidi tranantis, cum decem motus gradibus directè impingere in latus oppositum primi anguli; nonne totam vim quam à perpendiculari cursu obtinet, isti communicabit lateri in primo angulo? Ergò cura solà vi horizontali in ceteros angulos impingeret, aut cum vi sanguinis à tergo pellentis; ergò lapsu perpendiculari exorta vis in primis angulis, deperditur, nec eos transiit, & consequenter nullatenus in ultimis angulis, multò minùs ultrà, scilicet in vasorum extremis, in quibus fit eruptio sanguinis, sentitur. Ergò ad rupturam vasorum, nil facit, situs aortæ perpendicularis, alioquin primi, vel ad summum secundi anguli apices, in quibus vis illa maxima est, non autem extrema vasorum capillamenta disrumperebantur, quod rationi & experientia contrarium est. Dicant etiam qui tantum faciunt petum ex perpendiculari argumentum, quâ ratione fieri possit, ut diuturniori morbo decumbentibus mulieribus, vel aliâ quâcumque causâ ad præscriptum tempus non recurrant menstrua, quare in viris, quotquot ni-

miâ sanguinis copiâ turgentes deprehenduntur, periodica non contingat per hemorrhoidum vasa, excretio? At inquirunt, suffulciuntur hæc vasa & crassâ ac musculosâ intestini recti tunica, deffenduntur; esto, dissiliunt tamen in quibusdam; quid? Si ad pulmonum vasa respicias, multiplici plexu circâ bronchiales veliculas perreptantia, omnique prorsus fulmine destituta? Quid si ad cerebri arteriolas, in mille gyros abeuntes, suprâ fidem tenuissimas, neque tamen facillè disrumpendas? Vetat nimirum peculiaris quædam utriusque visceris fabrica, quâ expediendo ac promovendo sanguinis circulo cautum est. Nullis illic repagulis coercitus humor intrâ vasa congeritur, neque quod superfluit, per hæc loca amoliri satagit Natura. Restat igitur argumentum quo contendit Dominus Freind, momentum sanguinis augeri, quâ in plethorâ augetur quantitas imò & velocitas ejus; quod sanè falsum est, nam eâdem ratione quâ crescit quantitas, eâdem decrescit velocitas sanguinis, alioquin cordis & arteriarum vis contrariorâ à quâ sanguinis velocitas, majorem impertiri posset velocitatem, quod supponi nequit, si quidem non in infinitum crescit vis cordis, & quò magis distenduntur cordis & vasorum parietes, eò difficiliùs, & minori vi sanguinem pellent, ità ut non nisi intrâ certos limites eorum vigeat vis, & insuper minuitur velocitatis momentum, cum sanguis in mollia & parùm elastica vasa irruit. Neque est quòd dicat augeri velocitatem, quia in plethorâ major secerentur spirituum animalium copia, undè fortior, & frequentior cordis contractio; norunt omnes eundem produci effectum quoties resistentia eâdem ratione crescit, ac ipsa vis motrix, ut in casu præsentis moles sanguinis pellenda, eâdem ratione crescit, quâ secernuntur spiritus animales.

V.

VIS igitur quid clarius, nec repulsam parieris: talem sanguinis evacuationem in Simiis observatam unâ voce agnoscunt Medici, quod ex perpendiculari corporis situ præsertim, nec non & ejusdem partium genitalium conformatione deducunt, sed uno pariter ore aliorum brutorum femellas, fluxum menstruum non experiri asserunt. Hallerus pro causâ assert, duriora esse in iis uteri vasa, neque ità dilatabilia, ut arteriosum sanguinem recipiant, contendit que id demonstrari autopsiâ genitalium mulieris cum musculofo, & fibroso fenellâ brutorum utero sinubus carente, atque etiam ex cotyledonum indole, quæ lacteo succo absque sanguine turgent. Quibus certis animantibus tales evacuationes interdum contigisse haud dubium est, parvi facio observata, ut pote rariora, à quibus proinde, nihil jure aut meritò in scientiis concludi potest; sic Felix Platerus menstrua observari in cane fœminâ testatur. Menstruam purgationem, in equabus, scrois & ovis se aliquando notasse scribit Christian. Franc. Paullini, & ibidem refert Alexander de insulâ se habuisse Picam fœminam singulis mensibus in novilunio, ad 2 vel 3 dies, per inferiora, sanguinem, suo more, sat copiosè excernentem, cætera optimè sanam, quod cibus, initio adscripsit, quid igitur, num in Raiâ pisce ordinariam fluxum menstruum observavit Joh. Ott. Helbigius, quod & in caniculâ parvâ quam domi habuit Scurgirius, deprehendit.

Nec ad talia confugiendum est, ut constet, non solum mulieribus, menstrua contingere, sed etiam in brutis femellis, analogum quid observari, id est, statis temporibus, menstruantium fœminarum more, sanguinem, vel quid ipsi simile è pudendis effluere; ità certè mulieribus & Simiis non ità

propriam esse hanc evacuationem, quin & viris, & animalibus non solum quibusdam, sed & cuidam animalis speciei accidat, observanti constabit; nec mirum, natura enim simplex, & sibi uniformis, ubi sunt functiones eadem, iisdem machinis, & instrumentis utitur, & vice versâ, ubi eadem sunt machinæ, eadem instrumenta, ibi easdem esse naturæ functiones rectè concludas; porro quod ars Anatomica & Phisica in partibus mulierum genitalibus detegit, detegit idem in belluis fœminis, vel saltem in canibus, nec certè putandum est hæc temerè & fortuito, à naturâ ut utilium prodigâ; sic inutilium parçâ efformata fuisse; si igitur eadem in partibus canum femellarum genitalibus ac in mulieribus reperitur structura; eadem etiam actio, idem usus, in iis facilè demonstrari potest.

Concipere, gestare, parere, tria sunt brutis femellis ac mulieribus, ut omnibus notum est, communia; iis, conceptus æque facilis, gestatio æque operosa, partus dolorum & alæ æque plenus, eodem modo conceptus, à conceptione ad partum usque, eadem via est: quid igitur? non ne uterus, in femellis omnibus, excipiendo, concipiendo semini? Nonne ovulum fecundatum ex ovario, & tubâ fallopianâ recipiendo dicatur? In eo ut apud mulierem, fœtus per statutum tempus continetur. In eo nutrimentum, accrementum maturitatemque adipiscitur, donec tandem perfectus, vi uteri musculosâ, per vaginam expellatur; non minùs immensam vasorum segetem sibi vindicat uterus caninus, quàm muliebris, horum eadem planè conformatio, idem decursus, nam præter quatuor insignes quos affectat sibi arteriarum rivos uterus caninus, ut muliebris, alias etiam vasorum propagines è viscerum viciniâ mutuatur, hæc vasa non rectò tramite uterum ingrediuntur, non sunt in longum protensa, sed innumerus sibi invicem concorta modis, totam uteri substantiam, serpentino gressu, ut apud mulieres perreptant. Venarum alvei suis orbantur etiam valvulis, difficilis hinc liquorum reditus propter viam gyris & anfractibus asperam; ea tantùm deprehenditur differentia scilicet pudendi muliebris situs, respectu horizontis, perpendicularis est, idem etiam est situs arterialis fistulæ quæ à corde ad uterum sanguinem deportat, dum pudendi canini situs, respectu horizontis parallelus est, consequenter etiam vasorum quæ ad uterum pertinent, sed quid inde? An sibi semper similem, & in agendo certis, atque constantibus alligatam legibus naturam ab ipsis injustè recedere conicere licet. Dum præsertim experientiâ quotidianâ patet, non nisi post manantem ex utero sanguinem, ad generationem aptam esse canem femellam æque ac mulierem, constat etiam periodum illam, in canibus pari ripari comitatu. Effluit redundans humor sanguineus, donec utero gerat, tum ut plurimum cessat effluvium, humorem superfluum matrique inutilem, in sui nutrimentum absumente festu; quia verò, in ipsis mulieribus, infinita periodum accelerant, totidem retardant, ita pariter, & in aliis animantium femellis. Hinc sicut quibusdam semel in bimestri, contingunt flores mulieribus, aliis bis in anno, absque sanitatis periculo, aliis nunquam; ita nonnullis canibus femellis semel, aliis bis in anno redit periodus. Aliis per decem, aliis per quindecim, aliis per viginti dies, verè sanguineus humor è pudendis inflatis erumpit; quæ semel tantùm in anno calent, per viginti dies, hoc fluxu perluuntur. Huic autem opinioni haud leve firmamentum vel pondus accedit, quòd in eam descendit celeberrimus auctor. (a)

Sed cur sæpius in anno, fluxum hunc non experiantur canes, præstantissimum viri supradicti tractatum (b) adeas. In promptu ratio est. Corporis

(a) D. Alique.

(b) Traité des mœurs des Femmes.

magnitudo relativè minor, vitæ genus, exercitium majus, natura ad matrem vergens; hæc omnia in ipsis confirmantur mulieribus, quibus compeditur, menses penitus deficere, viraginibus herculei temperamenti, quæ cum ad robur masculinum accedant, & laboribus ut plurimum se exercent, alimentum omne faciliè digerant, quòd dici meritò potest, de canibus femellis, quæ nec vitæ genere, nec exercitio, nec fibrarum textu, nec partium compage, nec denique totius corporis temperie à maribus differunt. Quod de canibus femellis dictum est, in vaccis locum habet. Ruricolis enim omnibus notum est, his per quosdam dies humore quodam seroso, madescere genitalia, donèc tandem ad sui æstri summum pervenerint, se seque incredibili mansuetudine tegendas subjiciant; imò sicut dum lactantibus mulieribus lac deficit, cum menstrua fluunt, sic pariter certum est vaccas, dum æstuant, nullum, aut parum lactis suppeditare: quid igitur, aurigas, mangones, equorum amatores consulas, equas omnes, semel vel-bis in anno mucosum per genitalia madorem effundere ex constanti observatione jurabunt. Hic addendam censeo observationem, ab hujusce Academiæ Socio & Professore, (c) mihi traditam; cum enim in tempestate quâ cervi, cervas expetunt, Cervorum Cervarumque turmam herbâ jacentem vidisset, hanc accedendo in fugam expulit, & ad locum ab iis desertum cum venisset, herbam in quâ decumbentes cervas viderat, sanguine commaculatam non sine admiratione conspexit; cui observationi si confirmatio deesset, reperiri posset in vulgatâ venatorum dictione, cum canes, cervæ astuantis vestigia ex sanguine pudendis effuso agnoscunt. (d)

Si igitur rationi consentanea, observatione confirmata nullis objectionibus convelli possit hæc sententia, faciliât, & à Medicorum Scholis proflus explodatur vulgatissima opinio, & confidenter asseratur.

*Ergò non ab uteri, ejusque vasorum perpendiculari suu, Menstrus
Mulierum purgatio.*

DOMINI DOCTORES DISPUTATURI.

M. Petrus Laluette.

M. Josephus Maria-Francisus
de la Sone, Censor Regius,
Regiæ Scientiarum Academiæ
Socius, & Chirurgiæ
Gallicæ idiomaticè Professor.

M. Joannes-Claudius-Adrianus
Helvetius, Regi à Sanctoribus
Consiliis, Regiæ quæ
Medicus Primarius &
Regiæ Scientiarum Academiæ
Socius.

M. Silvester Antonius le Moine. M. Julianus Bussion.

M. Jacobus Benignus Winslow,
Censor Regius, Regiæ Scientiarum
Academiæ Regiæ quæ
Societatis Londinensis Socius,
Tentonice linguæ Regius
interpres, & in horto
Regio anatomis ac Chirurgiæ
Professor.

M. Petrus-Josephus Macquer,
Regiæ Scientiarum Academiæ
Socius.

M. Petrus Bercher, Scholarum
Professor & alius Præses.

M. Antonius Pepin, Regis
Consiliarius & in Portu Brestensi
Medicus Primarius.

Proponebat Parisiis JOANNES-FRANCISCUS-CLEMENS MORAND,
Parisinus, è Regiâ Scientiarum Academiâ Madritensi, nec non Saluberriam Facultatis Medicinæ Parisiensis Baccalaureus A. R. S. H.
1749, à sextâ ad meridiem.

(c) D. de la
Sone.

(d) Ils l'ont
reconnu par ses
souffures.